

Responding to an Opioid Overdose

SIGNS OF AN OVERDOSE



Cold,
clammy skin



Dizziness or
confusion



Discolored
lips or nails



Cannot be
woken up



Slow, weak, or
no breathing



Choking,
coughing, or
gurgling sounds



Pupils are
small



Drowsiness or
difficulty
staying awake

Substance Use Treatment Resources



Scan me

WHAT TO DO NEXT

1. Attempt to arouse person by shaking shoulders and calling their name
2. Call 9-1-1 (or step 3, whichever you can do quickest)
3. Administer naloxone in one nostril (do not test device). If there is no response within 2-3 minutes of the first dose, administer a second dose of naloxone in the other nostril
4. Start rescue breathing if you are in possession of a one-way barrier
5. Stay with the person until help arrives

Cómo Responder a una Sobredosis de Opioides

SEÑALES DE SOBREDOSIS



Piel fría o húmeda



Mareos o confusión



Decoloración de labios y uñas



No se puede despertar



Respiración lenta o ausente



Sonidos de asfixia, tos o gorgoteo



Las pupilas son pequeñas



Somnolencia o dificultad para mantenerse despierta

Recursos para el tratamiento del uso de sustancias



Escanéame

RESPONDIENDO A UNA SOBREDOSIS

1. Intenta despertar a la persona sacudiendo los hombros y llamando por su nombre
2. Llame al 9-1-1 (o al paso 4, lo que pueda hacer más rápido)
3. Administre naloxona en una fosa nasal (no pruebe el dispositivo). Si no hay respuesta dentro de los 2-3 minutos de la primera dosis, administre una segunda dosis de naloxona en la otra fosa nasal
4. Inicie la respiración boca a boca si tiene una barrera unidireccional
5. Quédese con la persona hasta que llegue la ayuda